

- 1) 以前造影剤検査を受けたことがありますか ☐ はい ☐ いいえ
いつ頃 ()
検査の種類 ()
その時副作用がありましたか ☐ はい ☐ いいえ
どのような症状でしたか ()
- 2) これまでに薬によってアレルギーがおきたことがありますか ☐ はい ☐ いいえ
アレルギーをおこした薬剤名 ()
- 3) 気管支喘息といわれたことがありますか ☐ はい ☐ いいえ
- 4) 現在、糖尿病の薬を飲んでいますか ☐ はい ☐ いいえ
はいの方 ⇒ メトホルミン・メトグルコ・グリコラン・イニシンク・その他
- 5) 褐色細胞腫・骨髄腫・マクログロブリン血症・テタニー・重篤な甲状腺疾患・腎機能低下
重篤な心疾患などの診断を受けたことがありますか ☐ はい ☐ いいえ
- 6) (女性の方へ)現在妊娠している、あるいは妊娠の可能性ありますか ☐ はい ☐ いいえ

説明日 年 月 日

説明医師

私は、造影CT検査の注意事項と副作用について説明を受け、十分に理解したうえで、検査を受けることに同意します。万一副作用が現れた場合には必要な処置を受けることも承諾します。

同意日 年 月 日

身長 cm

患者署名

体重 kg

《検査に対する注意事項》

- この検査で使用する非イオン性ヨード造影剤は病気の診断や状態を明らかにすることに役立ちます。
この薬は安全な薬剤ですが、次のような副作用があります。
①軽い副作用：吐き気・嘔吐・動悸・かゆみ・発疹など。治療が不要、又は1～2回の服薬や注射で回復(100人中5人以下の割合)
②重い副作用：血圧低下・呼吸困難・意識障害など。入院が必要、後遺症が残る可能性あり(2.5万人中1人の割合)
③死亡する危険性：40万人中1人の割合
造影剤の注射中に、血管の外に造影剤がもれることがあります。少量もれた場合は特別な処置は必要ありません。造影剤が多量にもれた場合は、皮膚を切開するなどの処置が必要になることがあります。
また、注射部位やその周辺の痛み・しびれが残る場合もありますが、非常にまれです。
- 検査前の食事
水分と糖分の補給のため、午前の検査は朝食を、午後の検査は昼食を控え、ジュース 200mlをお摂りください。また、CT検査までお茶や水で水分を補給してください。
- 検査時の注意
造影剤の注射中に、体全体が熱く感じるがありますが、数分で治まり心配ありません。注射中に針の周囲が痛い場合や、「気分が悪い」・「息苦しい」場合は、ただちにお知らせください。
- 検査後の注意
非イオン性ヨード造影剤を注射した後は、お茶や水で水分をいつもより多く飲んでください。
下記のような場合は注意が必要。
①医師により水分制限をされている方は、医師の指示の通りにしてください。
②まれに造影剤注射後数日たってから、じんましん・むくみ・血圧低下などの副作用が現れることがあります。その際は当病院にご連絡ください。
③糖尿病の薬(メトホルミン・メトグルコ・グリコラン・イニシンク・その他)を飲んでおられる方は、検査終了後48時間は糖尿病の薬を服用しないでください。
- 授乳中の方へ
非イオン性ヨード造影剤は母乳中に移行しますので、検査終了後48時間は授乳しないでください。